


06

마비증상(마비증상은 수면이나 깊은 잠에서 깨어나거나 일어나면서 몸의 일부에 통증이나 불편감을 느끼는 증상)을 주고 있습니다.



06

마비증상은 10분간 약간의 편안함을 느끼거나, 자주



05

04

마비증상은 10분간 약간의 편안함을 느끼거나, 자주



04

마비증상(마비증상은 수면이나 깊은 잠에서 깨어나거나 일어나면서 몸의 일부에 통증이나 불편감을 느끼는 증상)을 주고 있습니다.



03

마비증상(마비증상은 수면이나 깊은 잠에서 깨어나거나 일어나면서 몸의 일부에 통증이나 불편감을 느끼는 증상)을 주고 있습니다.



02

(자신이나 다른 사람에게 알리거나, 환자를 알리거나)



01

## 작동기법 교육 및 사용법

**저는 “아나필락시스 (알레르기 속)” 환자입니다**

이름 : \_\_\_\_\_

출생연도 : \_\_\_\_\_

알레르기 원인 :

의약품 : \_\_\_\_\_

식 품 : \_\_\_\_\_

기 타 : \_\_\_\_\_

# “응급처치” 가 필요합니다

## ① 자가주사용 에피네프린 근육주사

젝스트 / 에피펜 쥬니어 (0.15mg)     젝스트 / 에피펜 (0.3mg)

## ② “119”에 전화

## ③ 응급 연락처

이름 : \_\_\_\_\_ 관계 : \_\_\_\_\_

전화 : \_\_\_\_\_

아나필락시스 치료는 에피네프린 근육주사가 최우선입니다.  
천식 흡입제, 항히스타민제만으로는 아나필락시스를 치료할 수 없습니다.

대한천식알레르기학회

## “아나필락시스” 증상

- 아나필락시스는 갑자기 발생하는 심한 알레르기 반응입니다.

1. 피부 · 점막

가려움, 두드러기, 부종, 발적, 목 조임, 목 쉼

2. 호흡기

숨참, 기침, 천명음

3. 심혈관

어지러움, 식은땀, 눈앞이 캄캄, 맥박이 약함

4. 위장

오심, 구토, 복통, 설사

- 위의 증상 중 일부만 나타날 수도 있습니다.
- 생명을 위협할 수도 있으므로 빠른 응급처치가 필요합니다.
- 1~4 중 2개 이상 있으면 에피네프린 근육주사가 필요합니다.

대한천식알레르기학회